ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ ВОГУЛКИНСКОЙ ТОЛЩИ ПО ДАННЫМ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 3D.

Шкор А.И., Щербаненко В.М., Зверинский К.Н.
(ОАО "Сибнефтегеофизика")

Аннотация: По данным скважин создана априорная геологическая модель формирования песчаников вогулкинской толщи. Реконструирован палеоструктурный план на время формирования юрских отложений на основе палеотектонического анализа, методом изохорического треугольника. На основе куба псевдопараметра $\alpha_{ПС}$, полученного методом сейсмической инверсии, выполнен прогноз средней пористости пласта П. Полученная карта откорректирована в соответствии с результатами палеотектонического анализа. В итоге построена модель нефтяной залежи пласта П.

ВВЕДЕНИЕ

В приведенной работе решается задача прогноза геологического строения келловей-верхнеюрских отложений по материалам детальных сейсморазведочных работ МОГТ 3D.

Для создания априорной геологической модели были привлечены материалы по 115 скважинам, расположенным на изучаемом участке. Келловей-верхнеюрские отложения на севере Шаимского межавала представлены в палеовпадинах глинистыми отложениями абалакской свиты, которые в присклоновых участках замещаются преимущественно песчаными отложениями вогулкинской толщи. На сводах поднятий на кровле фундамента залегают отложения мулымьинской свиты. Вогулкинская толща состоит из трех пачек, сложенных песчаниками P_1 , P_2 , P_3 . Формирование этих песчаников происходило в процессе расширения позднеюрской трансгрессии и постепенного сужения областей сноса. Соответственно песчаники пласта P_3 распространены в нижней части палеосклонов, песчаники пласта P_2 в средней, а песчаники пласта P_1 в верхней части палеосклонов и на пониженных участках палеоподнятий.

Коллектора пласта П характеризуются неравномерным строением, поэтому актуальна задача картирования контуров распространения песчаников продуктивного пласта, детального прогноза его коллекторских свойств, выделения зон с улучшенными ФЕС. Основными прогнозируемыми параметрами являются пористость, литология, флюидонасыщение.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленной задачи выполнены:

- палеотектонический анализ изучаемой площади методом изохорического треугольника;
- получен куб псевдопараметра $\alpha_{ПС}$ методом сейсмической инверсии.

В результате проведенного палеотектонического анализа сделаны следующие выводы:

- палеоструктурный план в юрское время значительно отличался от современного структурного плана по кровле мулымьинской свиты: самым приподнятым было поднятие IV, наиболее низким- локальное поднятие I, поднятия II, III занимали про-

межуточное положение.

- наиболее глобальная инверсия тектонического развития произошла в палеоген-неогеновое время, в это время происходило резкое погружение северо-восточной части площади.

Куб импеданса совместно с кубом сейсмических данных были использованы для прогноза целевых характеристик продуктивного интервала (в данном случае прогнозировалось значение $\alpha_{ПС}$ в интервале, включающем юрско-валанжинские отложения). Для этой цели в пакете Hampson-Russell куб сейсмических данных последовательно пере-считывался в семейство кубов сейсмических атрибутов, на данной площади их количество составило 15. Критерием для выбора оптимальных параметров сети служат результаты, полученные по системе оценки *Cross-Validation*, на изучаемой площади среднеквадратическая ошибка составила 0.11, коэффициент корреляции 0.71. Полученный куб псевдопараметра $\alpha_{ПС}$ послужил основой для прогноза коллекторских свойств пластов P_1 , P_2 , P_3 . Максимальная мощность абалакской свиты на изучаемой площади составляет 35 м, на временных разрезах все песчаники этой свиты приурочены к отражающему горизонту П, поэтому нами сделан прогноз для всей толщи в одном временном интервале (П-8+15 мсек). Прогнозируемым параметром, характеризующим коллекторские свойства песчаников вогулкинской толщи, нами выбран коэффициент пористости (K_p), так как для определения коэффициента пористости для терригенных коллекторов с глинистым цементом служит корреляционная связь между относительной амплитудой $\alpha_{ПС}$ и K_p .

Выполненный прогноз средней пористости по кубу $\alpha_{ПС}$ — это, по существу, прогноз по динамическим параметрам. Далее этот прогноз был сопоставлен с результатами палеотектонического анализа. В соответствии с этим была откорректирована граница глинизации пласта в кровле поднятий II и III. В целом, полученный прогноз согласуется с априорной геологической моделью пласта П, на поднятии IV наблюдается наибольшая зона отсутствия песчаников вогулкинской толщи, пласт полностью заглинизирован в палеопрогибах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате сделан прогноз пористости, литологии и флюидонасыщения пласта П. На основе структурной карты по подошве мулымьинской свиты и карты средней пористости песчаников вогулкинской толщи, построена модель залежи пласта П, выполнен прогноз распространения коллекторов с улучшенными ФЕС в пределах этой залежи.